



VISION ACADEMY  
people | research | education



# 新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期间新生血管性年龄相关性黄斑变性患者及家属指南

## 调整门诊范围：



在这段时间，我们只关注需要紧急治疗和/或频繁诊治的患者。



对于非紧急的预约，我们会重新安排。

## 关于您接下来的预约：

### 计划：

- 您的医生办公室可能会联系您，了解您目前的健康状况。
- 我们正在调整日程安排，以将候诊室中的患者数量降到最低。



### 在您就诊期间：

- 为减少您在门诊停留的时间，您可能不需进行常规的视力测试或眼部扫描。
- 您的眼科医生可能会戴上口罩和防护眼罩，并且在检查期间只能与您进行有限的交谈。
- 您的医生办公室可能会通过电话推迟您下次预约的时间。



## 就诊期间降低接触风险的方法\*：



如果您直接感染了新的冠状病毒 (COVID-19) 或出现咳嗽，发烧或其他表明接触的症状，请提前通知您的医生办公室。



如果您到达诊所时身体不适，您可以会被重新安排预约。



如果您意识到要咳嗽或打喷嚏，请注意以弯曲的手肘或纸巾遮挡面部，并立即丢弃用过的纸巾。然后立即用肥皂和水或者消毒剂洗手。

## 就诊期间降低接触风险的方法\*：



仅限一名人员陪您就诊。



诊所可能会要求您或陪同您的人，在候诊室外等待，以保持社交距离。



在候诊室中，请与他人保持至少 1.5 至 2 米 (5 到 6 英尺) 的距离。



医生可能会，也可能不会，在治疗期间给您一个口罩要求您戴上。

\*请参阅您当地政府关于社会隔离措施的指南。

## 如果您不能按照预约赴诊：

您的医生办公室只要求那些急需治疗患者到医院就诊，并将采取一切措施将风险降至最低。但是风险不能完全消除，如果您在任何时候选择取消预约，您的医生仍会给予理解。



请尽快联系诊所取消您的预约并重新安排下一次预约。



在您下次按照预约赴诊之前，监测您的视力，比如用阿姆斯勒方格表 (AMSLER GRID) 测试。



如果您发现视力有变化，请联系您的医生以评估是否需要急诊。

若需进一步了解如何避免接触新冠病毒 (COVID-19) 并减少风险，请访问：  
[www.who.int](http://www.who.int)

Vision Academy 拥有全球 80 多名专家组成的国际小组。Vision Academy 通过汇集他们的专业知识，力求为视网膜疾病诊治中提供最佳临床实践指南，尤其是在缺乏结论性证据的领域。Vision Academy 由拜耳公司提供支持。

